



HENDEK REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ



YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK

OTİZM

ATİPİK OTİZM

HELLER SENDROMU

RETT SENDROMU

ASPERGER SENDROMU

OTİZM

OTİZM

Sosyal beceriler, tekrarlayan davranışlar, sözel ve sözel olmayan iletişimde zorluk yaşanması ile karakterize nörolojik ve gelişimsel bir bozuktur.

OTİZM

- Sözlü ve sözsüz iletişimde yetersizlik
- İsmine tepki vermeme
- Bakış anormallikleri
- Duyduklarını tekrarlama
- Tekrarlayıcı anlamsız motor hareketler (stereotipik davranışlar)

Stereotipik davranışlar;

El sallama, kanat çırpma, kendi etrafında dönme, parmak ucu yürüme, sallanma şeklinde görülebilir.

Çocuk yalnız kaldığında ya da kaygılandığında stereotipik davranışlar daha fazla görülebilir.



ATİPİK OTİZM

ATİPİK OTİZM

Tipik otizm tanı kriterlerinin hepsinin karşılanmadığı, daha hafif semptomlar gösteren bireylerdir.

Atipik otizmde bazen bir bazen birden fazla tipik otizm semptomları görülebilir.

ATİPİK OTİZM

- Uygunsuz sosyal davranışlar gösterme
- Dil ve konuşma yeteneklerinde gecikme
- Sözlü ve sözlü olmayan iletişimde yetersizlik
- Duyu organlarında azalmış ya da artmış duyarlılık
- Tekrarlayıcı davranış kalıpları gösterme (Stereotipik davranış)



HELLER SENDROMU

(ÇOCUK DEZİNTEGRATİF BOZUKLUK)

HELLER SENDROMU

Normal gelişim gösteren çocuklarda 2-3 yaşlarından sonra bir anda kazanılmış olan sosyal-duyusal-motor becerilerin kaybolması durumudur.

Heller sendromunda

- Sözel ve sözel olmayan iletişim becerileri
- Oyun
- Sosyal uyum ve davranışlar
- Motor beceriler
- Tuvalet eğitimi gibi alanlarda

görülen belirgin bir GERİLEME durumu söz konusudur .

Heller sendromunda yıkım çok ciddi düzeydedir. Çocuğun mental zekâsı yaklaşık 9 aylık bebeğin zeka düzeyine kadar gerileyebilir. Nörolojik ve biyolojik etkilerde gözlenebilir.

Gerileme sürecinden sonra tipik otizm semptomları gözlenebilir.



RETT SENDROMU

RETT SENDROMU

X kromozomu üzerinde oluşan genetik bir bozukluk sonucunda genellikle kız çocuklarını etkileyen ve 6. aydan sonra çocukta gerilemeye ve beceri kaybına sebep olan nadir bir hastalıktır.

Genellikle ilk altı ay normal gelişim gösteren bebeklerde, 6 ay ile 2 yaş arasında motor ve dil gelişiminde belirgin bir gerileme görülür.

Rett sendromu ilerleyen ve ilerledikçe yıkımı artan bir hastalıktır. Anlaşılması güçtür. Tek bir tedavi yöntemi bulunmaz bireye özgü tedavi planlanır.



ASPERGER SENDROMU

ASPERGER SENDROMU

Otizm spektrum bozukluğunun bir çeşididir. Sosyalleşebilme ve etkili iletişim kurabilme yeteneklerini sınırlayan gelişimsel bir bozukluktur.

Kız çocuklarında daha fazla görülür.

Alışkanlıklarına bağlı ve katı kullara sahiptirler.

Çoğunlukla zeka geriliği olmamasına rağmen iletişim becerilerinde eksiklik vardır.

İlk belirtiler genelde 4- 11 yaşları arasında başlar.

Kesin bir tedavisi yoktur.

